



Leggetele attentamente, sono consigli Utili
Non devono essere sostituite alla Competenza ed esperienza
di MEDICI VETERINARI



Guida ai TERMINI da conoscere per la CURA del Levriero adottato

Con l'aumentare del numero di Greyhounds e Galgo "recuperati" che hanno trovato una famiglia qui in Italia tramite il GACI, è importante essere a conoscenza dei "termini usati" e delle particolari situazioni mediche che possono capitare in questa razza.

Alcune di queste condizioni sono uniche dei Greyhounds da corsa, ma molte sono malattie dovute a cattivo allevamento e a mancanza di cure mediche generali. Malattie che non si riscontrano comunemente negli animali in queste zone sono estremamente comuni in questi cani, che sono stati infestati da pulci e zecche portatrici di malattie. Il cattivo cibo con cui sono stati nutriti, la carne non sempre fresca, portano a malattie intestinali che possono essere molto impegnative da trattare, e mettono a rischio tanto gli altri animali.

E' importante essere consapevoli delle speciali necessità di queste belle creature che hanno bisogno del nostro aiuto DOPO ESSERE STATE TRASCURATE ED ABUSATE. Aumentare le vostre conoscenze mediche delle particolari condizioni dei levrieri rescue aiuterà ad evitare errori nella diagnosi e cure potenzialmente pericolose per la vita.

ALOPECIA - La "sindrome della coscia pelata" che si vede in molti Greyhounds a riposo è dovuta in molti casi allo sfregamento in gabbia. E' spesso incolpato l'ipotiroidismo come causa, per quanto sia raramente vero. Molti riprendono il loro pelo col tempo, altri no.

ANEMIA - L'ematocrito di un Greyhound in salute è notevolmente più alto di quello degli altri cani. Un PVC (volume dei globuli) di 55-60% è considerato normale, un PVC del 45% può indicare anemia. I Greyhounds hanno spesso un WBC (numero dei globuli bianchi) più basso.

Un WBC di 5000-6000 può essere un accertamento conforme, qualche volta livelli più bassi sono trovati in cani con Babesia o Erlichia.

BABESIOSI - è una malattia relativamente comune trovata nei levrieri rescue.

E' un parassita del sangue, trasmesso dalla puntura di una zecca. Una titolazione bassa indica esposizione alla malattia, poiché una titolazione da alta a moderatamente alta può indicare la malattia attiva (persino senza segni clinici). La cura consiste in uno o due cicli con Imizol (Imidocarb) basati su di un nuovo controllo della titolazione.

La mancanza di trattamento, anche se senza sintomi, può risolversi in una crisi emolitica.

TORSIONE DELLO STOMACO - la torsione dello stomaco non è comune nel Greyhound o Galgo, per quanto, per la sua profonda conformazione toracica, torsione e dilatazione gastrica- volvolo e possono capitare in particolare quando corrono a stomaco pieno, o per l'eccessiva ansia.



Le schede del GACI

Leggetele attentamente, sono consigli Utili
Non devono essere sostituite alla VOCE esperta
di MEDICI VETERINARI

Guida ai TERMINI da conoscere per la CURA del Levriero adottato pag 2



DITA ROTTE- molti levrieri escono dalla pista o da caccie, con dita rotte o amputate. Queste sono spesso lesioni vecchie che sono irreparabili, non compromettendo comunque, una normale vita da levrieri da “casa”

CAMPYLOBACTER JEJUNI- il Campylobacter è un parassita molto comune trovato nelle feci dovuto alla cattiva alimentazione di questi cani nelle piste o da allevatori improvvisati, sono spesso nutriti con carne cruda contaminata che può essere l'origine di questo parassita. Alcuni antibiotici sono più efficaci per eliminarlo, la disinfezione costante è essenziale per prevenire la diffusione.

INFEZIONI CRONICHE- per la mancanza di cure mediche in molti casi i cani possono soffrire di infezioni croniche non curate. Otiti, cistiti, prostatiti e congiuntiviti sono esempi di infezioni non curate.

IPERTROFIA DEL CLITORIDE- molte femmine di greyhound e galgo sono affette da ipertrofia del clitoride dovuta alle iniezioni di steroidi ricevute negli anni. Può diventare meno prominente col tempo. Può portare ad infezioni vaginali o non mostrare evidenti segni del problema. Non è di solito consigliata la resezione chirurgica.

MALATTIA DELLA CORNEA - PANNUS- una malattia della cornea immuno-mediata relativamente non comune si può trovare in alcuni Greyhounds. Questa condizione può portare ad una totale opacità della cornea e alla cecità senza un opportuno, energico trattamento.

EMANGIOMA CUTANEO- I cani con poco pelo possono sviluppare piccole vescichette di sangue simili a lesioni in varie parti del corpo. Molto spesso appaiono sulla pancia e coscine, queste piccole lesioni rialzate sono aggravate o persino dovute alla luce del sole. Questo è il precursore benigno di una condizione cancerosa, perciò si raccomanda che i cani che sviluppano questa condizione siano protetti dalla luce del sole con protezione della pelle e abbigliamento protettivo.

MALATTIE DERMATOLOGICHE- a causa delle cattive condizioni sanitarie in cui sono tenuti, molti esecorridori soffrono di piodermite o di malattie allergiche della pelle. I comedoni sono comuni sul petto (i cerotti Biorè possono essere di aiuto). La seborrea è anche comune ed è spesso solo una risposta alla dieta. Altri prodotti possono essere di aiuto per uso topico (Resisoothe, Efa olio da bagno) o parenterale (Derm caps, Efa caps 3V Caps).

INTOLLERANZA ALIMENTARE- Molti levrieri mostrano una grande sensibilità ai cambi di alimentazione e molti soffrono di diarrea costante se non nutriti con cibo appropriato. Molti si trovano bene con diete Premium agnello e riso. Se la diarrea cronica in assenza di parassiti persiste, deve essere garantito un cambio di dieta.



Le schede del GACI

Leggetele attentamente, sono consigli Utili
Non devono essere sostituite alla VOCE esperta
di MEDICI VETERINARI

Guida ai TERMINI da conoscere per la CURA del Levriero adottato pag 3



ERLICHIOSI- un parassita del sangue trasmesso dal morso della zecca , Erlichia canis, è la forma più comune che infetta i cani. Questa malattia tende ad avere una natura cronica ricorrente. Molti cani hanno una titolazione elevata senza mostrare sintomi, altri possono averne molteplici. Titolazioni basse indicano esposizione, comunque ogni elevazione andrebbe trattata. Imizol è spesso molto di aiuto nella cura, gli antibiotici spesso non controllano la malattia o i sintomi. Una crisi emolitica è una realtà possibile con questa malattia.

FRATTURE- le fratture possono succedere in pista e spesso comportano l'eutanasia o il ritiro del cane dalle corse o caccie. Le ossa dei levrieri sono sottili e perciò sono più suscettibili alle rotture, anche quando stanno solo correndo in giardino. Alcune delle più comuni fratture in corsa sono quelle al calcagno/ astragalo e alle ossa tarsali. Le fratture del metatarso e del metacarpo sono comuni nel levriero da compagnia.

GIARDIA- un altro parassita molto comune nel levriero a riposo, approssimativamente il 75 % può averla. La Guardia può causare diarrea anche negli umani.

IPOTIROIDISMO- C'è una significativa controversia se l'ipotiroidismo capita nei Greyhounds o se normalmente hanno dei valori bassi di T4. Entrambe le cose sembrano essere vere. Sono stati fatti studi che mostrano come i Greyhounds possano avere normalmente bassi livelli di T senza essere ipotiroidei, sebbene altri ne soffrano realmente. Un controllo completo della tiroide (M.S.V.) aiuterà a determinare cosa è attualmente vero.

IDIOPATIE CUTANEE E VASCULOPATIA GLOMERULARE- questa è una malattia solo del Greyhound, che può manifestarsi come una dermatosi ulcerativa. Che può anche evolvere in una grave malattia renale che porta ad una forte compromissione dei reni e spesso alla morte.

La cura può avere successo, comunque la malattia può essere rapidamente fatale.

LESIONI- I levrieri hanno una pelle molto sottile e sono estremamente predisposti alle lacerazioni. Molte semplici lacerazioni diventano squarci a causa della pelle sottile e dello strato sottocutaneo praticamente inesistente.

MALATTIA DI LYME- un altro parassita portato dalla zecca, si riscontra più facilmente nei levrieri a riposo. Artrite cronica e malattia renale possono essere conseguenze di questa affezione.

PARASSITI- la maggior parte dei levrieri soffrono di parassitismo cronico. Pulci, zecche ed ogni possibile parassita intestinale si trovano comunemente. Guardia e Campylobacter sono rilevati di frequente.



Le schede del GACI

Leggetele attentamente, sono consigli Utili

Non devono essere sostituite alla Competenza ed esperienza di MEDICI VETERINARI

Guida ai TERMINI da conoscere per la CURA del Levriero adottato pag 4



DISTURBI MUSCOLOSCHIELETRICI- probabilmente i problemi più comuni visti in cani da corsa o caccia e spesso persino in quelli che corrono in giardino sono le lesioni muscoscheletrici.

Distorsioni, stiramenti, strappi ai muscoli, avulsione e lacerazioni dei tendini e legamenti sono riscontrati frequentemente. Alcune delle lesioni più comuni sono quelle dei tendini flessori superficiali e profondi delle dita che portano al "dito strappato" o al muscolo gracile, conosciuto come "muscolo della schiena strappato".

MALATTIA PERIODONTALE- a causa della cattiva alimentazione e della museruola portata costantemente, molti Greyhounds hanno denti rovinati, rotti e indeboliti, ascessi e gengive ritirate. I proprietari devono essere istruiti che è necessaria una cura dentale costante. Molteplici antibiotici, metronidazolo e Stomadex sono spesso di aiuto per controllare la malattia. Consigliamo una pulizia dentale

VOMITO- di solito non è una condizione patologica, molti cani mangiano il loro cibo così velocemente che lo vomitano immediatamente. Questo problema può essere spesso attenuato alzando la ciotola o usandone una più larga.

STARNUTO INVERSO- spesso è dovuto al modo di mangiare troppo velocemente o ad una leggera irritazione della gola, lo starnuto inverso spesso sembra come un rantolo per respirare. A volte un parassita chiamato Paragonimus può essere la causa di un cronico, frequente starnuto inverso. Questo parassita è anche conosciuto come parassita del polmone e vive nel passaggio dell'aria che porta ai polmoni, così causa irritazione e tosse o starnuto inverso. Si vede raramente negli esami delle feci di routine, così il trattamento è spesso raccomandato se è presente qualche sintomo.

ANSIA' DA SEPARAZIONE- E' una condizione che si riscontra frequentemente nei levrieri rescue.

Vocalizzazione eccessiva, comportamento distruttivo, sono i segnali classici visti spesso. I levrieri a riposo spesso diventano estremamente affezionati ai loro nuovi proprietari, seguendoli costantemente in giro per la casa e appena rimangono soli...vanno nel panico

STRAPPI Tra le dita- questo è un termine usato per descrivere lo strappo del tessuto interdigitale, che può succedere in pista come in giardino. Questa lesione si cura meglio tagliando e poi suturando insieme le due parti. Deve essere tenuto un bendaggio per almeno due settimane. Se non ha avuto successo, il cane può cavarsela con lo strappo fino a che si rimargina correttamente.

FERITE ALLA CODA- come altre razze di grande taglia e con la coda lunga, i levrieri spesso si feriscono alla fine della coda. Bendaggi appropriati sono di solito sufficienti per permettere la guarigione. L'amputazione è raramente necessaria ad eccezione per ferite che ci sono da molto tempo.



Le schede del GACI

Leggetele attentamente, sono consigli Utili

**Non devono essere sostituite alla Competenza ed esperienza
di MEDICI VETERINARI**

**Guida ai TERMINI da conoscere per
la CURA del Levriero adottato pag 5**



MALATTIE LEGATE AL FREDDO o AL CALDO Ipotermia ed ipertermia sono entrambe molto comuni nei levrieri a causa del loro minimo livello di isolamento termico. I proprietari devono essere avvisati che questa razza è più sensibile di altre a queste condizioni.

ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI

ANESTESIA- I Levrieri, sono predisposti a gravi effetti collaterali dovuti a certi anestetici. Non è raccomandabile usare barbiturici, a causa delle frequenti reazioni peculiari del Greyhound. I tranquillanti possono essere usati, ma la dose dovrebbe essere diminuita di circa la metà quando usati come pre-anestetici. Ketamina/Valium, così come Propofol sono raccomandati come agenti per l'induzione. Isoflurano o Propofol per il mantenimento. **L'ipertermia maligna** è stata rilevata nel Greyhound, per cui dovrebbero essere attentamente monitorati durante ogni procedura anestetica. Gli anestetici locali sono spesso di aiuto per rimediare a ferite minori, molti levrieri cooperano facilmente.

PREVENZIONE PER LE PULCI ED INSETTICIDI- bisogna essere consapevoli che i levrieri sono molto sensibili alla tossicità degli insetticidi. Gli organofosfati sono spesso mortali per i levrieri.

Composti con piretrine o feromoni delle pulci sono da preferire.

Esempi di prodotti sicuri sono:

Adams, Ketkem, Mycodex, Frontline, Program, Sentinel ed Advantage.

Esempi di prodotti non sicuri sono:

Zodiac, Blockade, Raid, collari antipulci, Proban, Breakthru e Biospot (gli ultimi due hanno un livello troppo alto di pirotina).

Questa è solo una visione di insieme di alcune delle più comuni condizioni nelle razze levriere.

Se avete ulteriori domande circa qualcuna di queste malattie o altro che colpiscono i greyhounds e le altre razze sportive, per favore fate riferimento ai seguenti materiali:

Care of the racing Greyhound-Blythe, Gannon and Craig.

Veterinary Practice Publishing Company, 1994 (805) 965-1028 Canine Sports Medicine and Surgery.

Bloomberg, Dee and Taylor.W.B.Saunders, 1998.

Incoraggio anche qualunque domanda e sarei felice di condividere la nostra esperienza con voi, e/o indirizzarvi agli specialisti che vi possano assistere.

GACI

Adozioni Levrieri Italia

www.adozionilevrieri.it



Le schede del GACI

